

Studio sui morsi di ragno in Svizzera

Gentili Signore, Egregi Signori

Con la presente vorremmo informarVi che da giugno 2011 fine novembre 2012 avrà luogo una raccolta di dati riguardo casi di morsi di ragno in Svizzera. Il picco di frequenza di morsi di ragno ha luogo nei mesi di luglio ed agosto, solitamente all'imbrunire o durante le prime ore della notte. Le morsicature vengono avvertite come una puntura di vespa. Vi sono solo sporadiche descrizioni di casi di morsicature di ragno in Svizzera; sospettiamo tuttavia che tali casi siano molto più frequenti e desidereremmo nelle prossime stagioni, se possibile, registrare **tutti i casi**, sia quelli benigni che quelli complicati.



Figura 1. *Cheiracanthium punctorium* a riposo nella „tana di ragnatela“

Nella figura allegata potete osservare un esemplare di *Cheiracanthium punctorium*. In estate questo ragno depone tra l'erba alta bozzoli di uova che protegge aggressivamente nei confronti di animali o uomini che vi si avvicinano. Questo ragno è probabilmente responsabile per la maggior parte delle morsicature da ragni indigeni. In Svizzera, i morsi di ragno non rappresentano certamente un grave problema di salute pubblica. Ciononostante sono spesso causa di insicurezza, siccome le persone colpite sono ignare del loro decorso abitualmente benigno. Anche ad alcuni medici forse il quadro clinico non è familiare.

Cosa può fare? Parli con amici e parenti della possibilità di morsi di ragno. Consigli loro, in caso di morsicatura, di catturare il ragno. Siccome Lei stesso/a potrebbe essere morso/a quando cerca di catturare il ragno, Le consigliamo per Sua sicurezza e protezione, di catturare il ragno in un recipiente chiudibile (per esempio un barattolo di vetro per confettura). Anche ragni morti possono essere spediti. Successivamente dovrebbe portare il ragno catturato al Suo medico di famiglia con la preghiera di riferire al nostro studio l'accaduto e di far determinare/identificare il ragno. Ovviamente possono essere annunciati anche casi di morsicature di ragno, nei quali non è stato possibile catturare il ragno. *Non* dovrebbero essere annunciati casi di morsicatura che non hanno provocato disturbi/sintomi o che hanno provocato disturbi/sintomi talmente minimi che non rendono necessaria una consultazione medica.

Questo studio è stato esaminato dalla commissione etica del Canton Zurigo e non sussistevano obiezioni contro la sua esecuzione.

Con i migliori ringraziamenti per la Sua collaborazione

Dr. med. Markus Gnädinger, Istituto di Medicina di famiglia dell'Università di Zurigo, www.spiderbites.ch

Dr. med. Alessandro Ceschi, Capo servizio scientifico, e Signora med. pract. Joan Fuchs, collaboratrice scientifica, Centro Svizzero di Informazione Tossicologica, Zurigo.

Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Nentwig, Istituto di Ecologia ed Evoluzione, Università di Berna.